苗木の植え付け方法

植え付け


苗木は台と穂の接合部より、30～50cm の高さの葉芽が充実したところで、ぶどうでは三～四節先で切り、根は損傷している部分だけ切り落とし、植穴の四方にやや斜下方向に広げ、幹を真直ぐ立てるように置く。

その上に細かく砕いた表土又は肥沃土で軽く覆土し、灌水して根と土の密着を促し、再度覆土する。その際苗木が沈み深根にならないよう、できるだけ浅根にする。

特にぶどうは接合部が地中になると、自根が発生するので注意を要する。植え付け当初は、寒さや乾燥によって切り口から枯れ込む事があるので、苗木の接合部から 3cm 位上まで、砂、又は軽い土を盛っておくとよい。発芽後も接合部までは、梅雨期頃まで、そのままにし、乾燥させないようにするが、自根が発生しやすいので時々見回る。

植え付け後の管理

苗木が倒れないように、支柱を立て誘引し、根の乾燥を防ぐために、苗木の周り植え穴いっぱいに敷きわらを施す。新根の生長を助け、初期の生育を促進するために少量の窒素肥料を溶かし、液肥として灌水をかね、施すのもよい。



※土の中に堆肥を混入すると根を痛め、枯死の原因となる可能性がありますので御注意ください。

作成　福岡県苗木農業協同組合

※一部写真は、長崎県農林技術開発センターの資料より引用しております。



FRUIT TREE SEEDLINGS CATALOG

2026-2027

果樹種苗カタログ

農林水産大臣賞 14 回受賞
（一社）日本果樹種苗協会正会員
日本果樹種苗業者協議会会員

繁　樹　園

代表　古賀　繁喜　　古賀　政敏
（日本果樹種苗管理士）

〒839-1234 福岡県久留米市田主丸町豊城 1083
TEL 0943-72-2768 FAX 0943-73-3097

ごあいさつ

平素より格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

昨今の異常気象の影響など、大変なご苦労をされていることと案じております。皆様の安全を心よりお祈り申し上げます。

近頃は人件費や材料費などの高騰により果樹苗木生産業を取り巻く環境も厳しさを増してまいりました。

しかしながら今まで培ってきた技術や伝統、田主丸の地という武器を生かし従業員一同、生産管理に励んでいるところです。出荷時期には皆様に喜んでいただける様な素晴らしい苗木をお届けできると思いますので、園地の計画的な栽培のためにもお早目のご用命の程よろしくお願い申し上げます。

園主敬白



ご注文について

1. 御注文は注文書又はFAXにて、品種・等級・数量・宛先等を明瞭に御記入下さい。
2. 代金は総て前金にて御願い致します。半額御送金の節は残金は代金引換にて発送致します。
3. 御注文の苗木は永年の経験により如何なる長距離輸送にも荷傷みや乾燥しない様に完全に梱包の上発送致します。
4. 荷造り費・送料は別途いただきます。
5. 果樹苗木では、100本以下の御注文の節は2割を御加算下さい。
6. 相場は時々変動がありますので、この場合は時価相場にてお願い申し上げます。
7. 補償について
   果樹苗木の販売に際しましては万全を期しておりますが、万一何らかの手違いで起きた異品種の混入につきましては同一本数の特等苗、または、お買い上げ時の代金相当額を以て最大限の補償とさせていただきますので、予めご了承の上ご注文ください。尚、植え付け後の苗木の枯死等については補償対象外です。

健全な苗木供給のために

茎頂接ぎ木によるフリー化処理



ポット苗の高温処理による萌芽




茎頂（0.3mm）



カラタチ台木への置床（接ぎ木）

Virus Free





約1ヶ月後

昭和62年以降、カンキツ、ブドウ、ナシ等
果樹100品種以上のウイルスフリー化を実施、母樹を保存

最近問題になっていますウイルス病につきましては、福岡県農林業総合試験場　資源活用研究センター（田主丸）苗木・花き部のご指導を仰ぎ、優良母樹及びウイルスフリー苗の生産に努力しています。目下、各優良品種より随時フリー化を実現しています。今後さらに強力に進める予定です。
※ウイルスフリー苗木につきましては、検定をいたしておりますが、その後の管理等により感染する可能性もありますので、苗木の取り扱いにはご注意下さい。

FUKUOKA ONE HEALTH

FUKUOKA ONE HEALTH

環境保護などを考慮し、
福岡県ワンヘルス認証を取得して
県内外にPRしています。

「農研機構」や長崎県・東京都などが開発した

種苗法登録の苗木は『証紙』を貼って販売しています！

◎「果樹の新品種」は、種苗法に基づいて農水省に品種登録を出願し登録が認められると、出願登録者には 30 年間、登録品種を独占的に利用する権利（育成者権）が法的に保証されます。

●育成者権を保有する者の許可なしに、勝手に登録品種の苗木を増殖したり・販売することは種苗法違反となります。

◎種苗業者は、「農研機構」などが育成した登録品種の生産・販売等をするため、（一社）日本果樹種苗協会（果種協）と利用許諾契約を結び、種苗法を遵守し、確かで健全な苗木の円滑で迅速な普及・拡大を図っています。

●農家や一般消費者は、登録品種の果樹を栽培する場合、育成者から苗木の生産・販売等の許可を得た種苗業者が生産した苗木を購入しなければなりません。本カタログでは、「登録品種」には、PVP マークを表示しています。

◎種苗業者は、「農研機構」等育成の登録品種を販売するにあたっては、「法と契約を守って生産された確かな苗木」であることを証明する果種協発行の『証紙』を苗木一本ごとに付けることが利用許諾契約で義務づけられています。

●「農研機構」等の種苗法登録品種でありながら、『証紙』の付いていない苗木の販売は、違法に増殖された可能性もあります。許諾なしの苗木の生産・販売では、生産者も販売者も、購入して栽培した者も、差し止めや損害賠償を求められたり、悪質な場合には刑罰を課せられることもあります。

◎『証紙』の付いた苗木は、以下のことを示しており、信頼でき、安心して販売・購入できます。

●種苗法に基づいて登録されている品種であること（登録品種は PVP マークで表示されています）

●「海外持出禁止（農水大臣公示有）の表示のある品種は、輸出を含め海外持出しは禁止されていること。

●果種協を通じ、育成者の保有する母樹から採取・譲渡された穂木をもとに増殖された確かな品種であること

●ウイルスなどに感染していない母樹から採取した穂木を使って増殖した健全な苗木であること
（出荷時にはウイルスフリーであっても、その後の管理や媒介昆虫等によりウイルスに感染する可能性もありますので、ご注意下さい）

●種苗法に基づく利用許諾を得た種苗業者が、正規に増殖・販売した苗木（通し番号付与）であること

果種協発行の４種類の『証紙』



農研機構育成登録品種用「農研機構登録証紙」



都道府県・大学等育成品種用「都県・大学証紙」



台木利用登録用「JM 特別証紙」



果種協が紹介する民間育成登録品種用「民間証紙」

◎種苗法を遵守し、確かで健全な苗木を普及させるための全国的ルールをご理解いただき、果種協が扱う登録品種の苗木では、必ず『証紙』が付けた苗木を販売・購入されるようお願いします。

●『証紙』についてのお問い合わせは、日本果樹種苗協会（TEL：03-3523-1126）までご連絡ください。

PVP

このマークは種苗法の登録品種を表示するマークです。
このマークの付いている種苗を、育成者の許可なく利用（増殖、譲渡、輸出入など）又は、海外へ無断で持ち出したり、提供したりする行為は、損害賠償、刑事罰の対象となりますのでご注意ください。

登録品種一覧表

柑橘

あすき	
瑞季	
璃の香	
みはや	
あすみ	
津之望	
津之輝	
西南のひかり	
はるひ	
べにばえ	
たまみ	
麗紅	
せとか	
かんきつ中間母本農6号	
カンキツ口之津41号	
はれひめ	
ぷちまる	

柿

輝太郎	
太雅	
麗玉	
太豊	
貴秋	
甘秋	
早秋	
太月	
太天	
つきまる	
八秋	

栗

美玖里	
ぽろたん	
秋峰	
ぽろすけ	

梨

なるみ	
はつまる	
ほしあかり	
甘太	
凛夏	
なつしずく	
あきあかり	
あきづき	
王秋	

りんご

ルビースイート	
ローズパール	
もりのかがやき	
紅みのり	
錦秋	

桃・すもも

ひめこなつ	
ひなのたき	
なつおとめ	
つきあかり	
つきかがみ	
さくひめ	
ひめまるこ	
ハニービート	

梅

翠香	
露茜	
麗和	
和郷	

あんず

おひさまコット	
ニコニコット	

ぶどう

BKシードレス	
サニールージュ	
シャインマスカット	
クイーンニーナ	
サンヴェルデ	
涼香	
グロースクローネ	

びわ

はるたより	
なつたより	

キウイフルーツ

東京ゴールド	

※なお、カタログ内の PVP マークを付した登録品種の中には、種苗法及び利用許諾契約により取次販売となる品種もございます。

※当園における取次販売は、上記の☑印の品種となります。

有望育成品種



せとか

PVP

(「清見」×「アンコール」)×「マーコット」

農研機構において育成された品種。成熟期は２月、果実重は250ｇ以上と大果。糖度13%以上で食味良好。果皮は滑らかで薄く、橙色～濃橙色で外観は極めて美麗。豊産性で、樹勢は中程度で連年結果し、結実性良好である。

果重:250g | 果形:扁平 | 収穫期:2月上旬～2月下旬



璃の香（りのか）

PVP

「リスボンレモン」×「日向夏」

農研機構において、「リスボンレモン」に「日向夏」を交雑して育成したもので、かいよう病に強く栽培性に優れ、加工適性があり、新たな需要が期待できる新しいレモンの品種である。果実重は平均200g程度であるが、結実状況によっては250g以上の果実も生産され、11月下旬から収穫できる香酸カンキツで、果実の生理障害の発生や耐寒性についての問題はみられないため広くカンキツ栽培地帯での栽培が可能と考えられる。

果重:200g | 果形:紡錘 | 収穫期:11月中旬～12月下旬



あすき

PVP

「カンキツ興津46号」×「はるみ」

農研機構において、3月に成熟し、高糖度で食味に優れ、無核で、じょうのう膜が薄く食べやすく、加えて芳香を有するカンキツを目標に育成された品種である。樹勢は中～やや強程度。果実重は180g前後。果形は扁球形。果実の着色開始期は「あすみ」と同時期。また完全着色期も「あすみ」と同程度で遅く、12月後半となり、年内に完全着色しないこともある。完全着色した果実の果皮は橙色で、果面は滑らかである。果皮の厚さは2.7mm程度と「あすみ」や「せとか」に比べて厚い。

果重:180g | 果形:扁平 | 収穫期:2月下旬～3月下旬



美玖里

PVP

「石鎚」×「秋峰」

農研機構にて育成された最新品種。収穫期は９月下旬で「筑波」と「石鎚」の中間。果実重量は28g程度で大きい。果肉は黄色で甘味と香気が多く食味良好。

果重:28g | 果形:帯円三角 | 収穫期:9月下旬～10月上旬

有望育成品種



つきまる　PVP

太月×甘秋

農研機構が育成した完全甘柿の新品種。収穫期は10月下旬で「松本早生富有」より約1週間、「富有」より約3週間早く収穫できます。果実は平均約414gと非常に大きく丸みのある美しい果形が特徴です。糖度は16～17度と高く「富有」と同等の甘さを持ちます。また、果頂裂果の発生が少なく、常温で約36日と日持ち性にも優れてることから国内流通だけでなく輸出向け品種としても期待される。

果重:414g｜果形:扁平｜収穫期:10月下旬



甘太　PVP

「王秋」×「あきづき」

樹勢は強く、枝の発生の多少は中程度。短果枝と、えき花芽の着生はともに多く、着花は安定している。収穫期は10上旬で、「新高」に近い時期である。果実の重さ570gで大きい品種。果肉の硬度は「幸水」「豊水」なみで、「新高」より柔らかく肉質良好。糖度は「幸水」「豊水」「新高」より高く甘い品種である。食味が優れるのが特徴。日持ち性は「新高」ほど長くなく「豊水」と同程度である。栽培が容易で豊産性の晩生ニホンナシ新品種。

果重:550g｜収穫期:9月下旬～10月中旬



輝太郎　PVP

「宗田早生」×「甘秋」

鳥取県園芸試験場が育成した新品種である。樹勢は中庸からやや強く、樹姿はやや開張性である。単位結果性・種子形成力は中程度であるが、形成された種子が生育途中でしいなになるものが多く見られる。早生の完全甘ガキである。成熟期は鳥取市において10月上旬であり、「早秋」とほぼ同時期である。果重は320g程度で、栽培管理によっては400g以上の果実の収穫も十分可能である。糖度は16～17%程度で熟度が進むにつれ上昇する。果汁は多く肉質は緻密であるが、熟度が進むにつれ果肉は柔らかくなる。

果重:320g｜果形:扁円｜収穫期:10月上旬～10月中旬



さくひめ　PVP

「296-16」(「よしひめ」×「coral」)×「332-16」(「あかつき」×「297-2」)

農研機構において育成された早生桃。収穫期は、6月下旬位で「日川白鳳」より5日ほど早い。果肉は白色で溶質であり、果汁は多い。糖度12～13%程度あり酸度はpH4.6前後と少ない。早生品種としては食味良好である。早生で大玉の生食用白肉品種であることから、早生品種の栽培割合が高い西日本などの産地で普及が進むことが想定される。

果重:230-250g｜花粉:有｜収穫期:6月下旬～7月上旬

柑橘育成品種



ゆら早生

極早生人気No.1

昭和６０年に和歌山県の園で「宮川早生」の枝変わりとして発見された。樹姿は開張性、樹勢及び枝梢の太さは中、節間は短い。果形は円形、果実の大きさはやや小。果皮及び果肉の色は極早生としては濃い黄橙色。果皮はやや厚いがじょうのう膜は軟らかい。極早生としては糖度が高く（１２％程度）、減酸は中程度。育成地では成熟期は１０月上旬。

果重:110g | 果形:扁球 | 収穫期:10月上旬～10月下旬



瑞季

PVP

「水晶文旦」×「サザンイエロー」

広島県立総合技術研究所農業技術センターにおいて、京都大学との共同研究により育成した品種である。樹勢は中程度で、樹姿は直立性と開張性の中間である。果実重は400～500g程度で、種子は2個程度で少ない。ブンタンの爽やかな風味を有しており、わずかな苦みがある。果肉は柔らかく多汁でカットフルーツに適している。3月に収穫して貯蔵すると、4月中下旬には糖度12%程度、酸度1%程度となり、糖酸比が高く食味は良好である。

果重:450g | 果形:短卵 | 収穫期:3月上旬～4月下旬



はるみ

「清見」×「ポンカン」

農研機構において育成された品種。樹勢は、中程度で直立ぎみである。果実の大きさは190ｇ程度で、糖度は15%程度、果皮は橙色、熟期は１月で、食感はポンカンと類似し、じょうのう膜は薄く柔らかいが果汁がこぼれることなく食味良好である。

果重:190g | 果形:扁球 | 収穫期:1月上旬～2月下旬



西南のひかり

PVP

(「アンコール」×「興津早生」)×「陽香」

成熟期は12月上中旬の早生カンキツ。果実重は180ｇ程度。果皮は橙～濃橙色で赤みがさし、薄くて剥皮が容易である。糖度は13%と高く、じょうのう膜は薄く、「オレンジ」と「アンコール」を混合したような芳香があり食味良好である。果肉には発ガン抑制等の働きを持つと言われる機能性成分のβ-クリプトキサンチンを多く含む期待の品種である。

果重:180g | 果形:扁平 | 収穫期:12月上旬～1月上旬

柑橘育成品種



かんきつ中間母本農6号 PVP

手で収穫できる加工に適した品種!
「キング」マンダリン×無核紀州

成熟期は1月下～2月下旬。糖度は12%と高く無核性。良食味性及び機能性成分高含有。果実は扁球形で約120gと小果で果皮は橙色。浮皮の発生は無く剥離性は中程度。果肉は橙色で多汁。じょうのう膜の硬さはやや軟らかく、「キング」マンダリンに似た風味。

果重:120g | 果形:扁球 | 収穫期:1月下旬～2月上旬



ぷちまる（種なし金柑） PVP

果実重11g程度で果形は長球。果皮は濃橙色で厚さは中。糖度は11%程度。果汁量はやや少なく。甘味が多く、芳香は中で種子はなく単胚性。

果重:10g | 果形:長球 | 収穫期:1月上旬～2月下旬



あすみ PVP

「カンキツ興津46号」×「はるみ」

果実の着色遅延の改善やかいよう病の発生を防止するために施設栽培向きとされているが、過去に育成された中生品種の減酸の遅れ問題に対しては改善されている。露地栽培において成熟期は1月下旬～2月上旬、糖度は16%以上と極めて高く、果実重は150ｇ程度。完全着色した果皮は橙色で薄く剥きやすい。果肉は濃橙色で肉質はやや硬く食感に特徴があり食味良好な商品価値の高い有望品種である。

果重:150g | 果形:扁球 | 収穫期:2月上旬～2月下旬



みはや PVP

「津之望」×「No.1408」

成熟期は11月下旬とかなり早く、糖度は12％以上、酸味は0.6%で食味に優れている。果皮は赤橙色で滑らか、薄く剥きやすい。果実重は190ｇ程度と大きく、浮皮の発生はなく、比較的病害にも強い。近年の天候不順などによる果実品質の不安定さなどから特徴ある新しい早生カンキツとして期待される。

果重:190g | 果形:扁球 | 収穫期:11月下旬～12月下旬

柑橘育成品種



津之輝 PVP

(「清見」×「興津早生」)×「アンコール」

成熟期は露地で1月中旬～2月上旬。また施設で少加温すれば12月上旬に成熟する早生カンキツ品種である。果実重は180g程度、施設栽培では250gの大果となる。糖度13%と高く、濃厚なあじわいで食味良好である。果肉には機能性成分のβ-クリプトキサンチンを多く含む期待の品種である。

果重:200g | 果形:扁球 | 収穫期:1月中旬～2月上旬



ブラッドオレンジ

イタリア原産のオレンジの一種である。その名の通り血のような色の果肉を持っており、幾つかの品種が存在する。甘くて果汁が多く、生食のほかジュースなどにも使われる。

果重:200g | 果形:扁球 | 収穫期:2月上旬～2月下旬



麗紅 PVP

(「清見」×「アンコール」)」×「マーコット」

農研機構において育成された品種。成熟期は1月中旬で果実重は210g。糖度12%程度で果汁が多く、芳香があり食味良好。果皮は赤橙色～濃橙色で名前のとおり外観美麗である。また花粉を持たないため、施設等で隔離栽培すれば種なしとなる。

果重:220g | 果形:扁平 | 収穫期:1月中旬～2月上旬



日南1号

日南市の野田明夫氏の園の「興津早生」の枝変りとして発見された。極早生温州で9月上旬頃より収穫され、樹勢強く、樹姿は開張性である。果実の外観は扁円、果面は極めて平滑、果皮はうすく従来の極早生より糖度が数段高く極早生品種のなかでは、最も多く植栽されていると思われる。

果重:120g | 果形:扁平 | 収穫期:9月下旬～10月上旬

柑橘育成品種



上野早生

佐賀県の上野寿彦氏が「宮川早生」の枝変わりとして発見した品種である。樹姿、樹勢は「宮川早生」と同程度で、結実性は良好で豊産性であり、栽培しやすい系統である。果形は「宮川早生」よりやや扁平で玉揃いがよく、果面はなめらかで果皮は薄い。成熟期は「宮川早生」と比べると10～15日程度早く、極早生の中ではとりわけ早いわけではないが、糖度が比較的高く食味が濃厚で、熟期が早い割りに11月に入っても味ボケせず、浮き皮の発生が少ない。

果重:120g | 果形:扁平 | 収穫期:10月上旬～10月中旬



原口早生

長崎で人気の品種!

来歴「宮川早生」の枝変わり。収穫期10月下旬～11月下旬。果実は120g程度で宮川早生より扁平で果肉の成熟が早い早熟型の早生温州。

果重:120g | 果形:扁平 | 収穫期:10月下旬～11月下旬



肥のあけぼの

「楠本早生」×「川野なつだいだい」

熊本県農業研究センターにおいて、「楠本早生」に「川野なつだいだい」の花粉を交雑してできた珠心胚実生。
樹勢は比較的強いが、結実性は良好で隔年結果は少なく、豊産性である。果形は扁球形で玉揃いよく、果面はなめらかである。完着果の果皮色は紅ののりがよく濃厚で出荷の適期は10月中旬以降である。

果重:120g | 果形:扁球 | 収穫期:10月中旬～10月上旬



宮川早生

早生人気No.1

福岡県で明治末期に普通温州の枝変わりとして発見され、全国的によく知られた早生の代表的な品種である。樹勢は強く、豊産性で作り易い。じょうのう膜は軟らかく、糖酸共に高く食味濃厚で特に施設化向けの品種として最適である。

果重:120g | 果形:扁球 | 収穫期:11月上旬～12月上旬

柑橘育成品種



田口早生

本品種は、「興津早生」の枝変わりで、樹勢は中程度。果形は円形、果実は120g程度である。果汁が多く、糖度は12～13%。浮皮の発生が少なく、貯蔵性も良好で、熟期は育成地（和歌山県）において、11月上旬である。じょうのう膜は柔らかい有望品種である。

果重:120g | 果形:扁球 | 収穫期:11月上旬～12月上旬



興津早生

早生種の代表品種

本品種は現在の早生種の代表品種であり、全国的に知られた品種である。旧農林省園芸試験場（現農研機構果樹茶業研究部門）において「宮川早生」×「カラタチ」を交配して得られた種子からの珠心胚実生である。樹勢は強く優良系統で果実は扁平、味は濃厚で結実性はきわめて良く豊産である。熟期は10月下旬～11月上旬である。

果重:120g | 果形:扁球 | 収穫期:11月上旬～12月上旬



小原紅早生

昭和48年に香川県の園で「宮川早生」の枝変わりとして発見され、その後、香川県農業試験場で試験を重ね、平成5年に登録された品種である。樹姿は開張性、樹勢及び枝梢の太さは中、節間は短い。果形は円形、果実の大きさはやや小。果皮及び果肉の色は濃い橙色。果皮薄く、じょうのう膜は軟らかい。糖度が高く、12%程度。育成地では成熟期は11月下旬から1月上旬。

果重:120g | 果形:扁平 | 収穫期:11月上旬～12月上旬



石地

本品種は、「杉山温州」の中から発見された変異樹であり、果形が扁球形、果実の重さが中、果皮色が濃橙色の育成地（広島県）では、11月中～下旬に成熟する温州みかんである。樹姿はやや直立性、樹の大きさは中、樹勢は強である。浮皮の発生が少なく、貯蔵性も良い。年内出荷の中生種として有望な品種である。

果重:130g | 果形:扁球 | 収穫期:11月中旬～12月中旬

柑橘育成品種



南柑20号

中生の代表品種!

早生温州に引き続いて年内に出荷される中生品種の中心的品種で、結実性良好、豊産性であり隔年結果は少ない。果実はやや大果の傾向で玉揃いはよい。果形はやや扁平形で、果皮色は濃厚で深みのある外観である。成熟期は11月上～中旬である。

果重:120g | 果形:扁平 | 収穫期:11月中旬～12月下旬



尾崎温州

長崎県で宮川の枝変りとして発見された。樹勢はやや弱い。葉色は濃く、新梢の発生も多い。収穫は、11月下旬～12月上旬。高糖系温州で、浮皮が少なく、完熟品種として有望品種である。

果重:120g | 果形:扁平 | 収穫期:11月下旬～12月下旬



大津4号

神奈川で人気の晩生みかん!

神奈川県の大津氏が育成した珠心胚実生。樹勢は旺盛で、枝の分岐角度は広く、枝梢の発生も多い。結実性は良好で果実はきわめて扁平大果である。玉揃いは極めて良好で、着色は11月中旬に完全に着色し、果皮は平滑で美麗で濃厚な橙色となる。果汁は糖度が高く、酸は少なく甘味比が高く、食味が早くから良い。

果重:120g | 果形:扁平 | 収穫期:11月下旬～1月下旬



青島温州

晩生の代表品種!

静岡県福田谷、青島平十氏が、市内賤機山北面にある尾張温州園で芽条変異として発見された。果実は大果で、きわめて扁平で果重は130ｇ位、果面は油胞が小さくなめらかで、果皮はしまり浮皮になりにくい。果汁は糖、酸ともに多く風味濃厚で貯蔵性は良好である。

果重:130g | 果形:扁平 | 収穫期:12月上旬～1月下旬

柑橘育成品種



はれひめ PVP



たまみ PVP



はるか



不知火



スイートスプリング



甘夏



河内晩柑



ジャバラ



ライム



柚子



レモン



カボス

柑橘収穫期一覧表

温州

	品種名	果形	果重(g)	9月 上	9月 中	9月 下	10月 上	10月 中	10月 下	11月 上	11月 中	11月 下	12月 上	12月 中	12月 下
極早生	大分早生	扁平	100		■	■									
	豊福早生	扁平	120			■	■								
	日南1号	扁平	120			■	■								
	岩崎早生	扁平	120			■	■								
	上野早生	扁平	120				■	■							
	ゆら早生	扁球	110				■	■	■						
	肥のあけぼの	扁球	120					■	■						
	肥後早生	扁平	120					■	■						
	原口早生	扁平	120						■	■	■	■			
早生	宮川早生	扁球	120							■	■	■	■		
	田口早生	扁球	120							■	■	■	■		
	興津早生	扁球	120							■	■	■	■		
	山下紅早生	扁平	120							■	■	■	■		
	小原紅早生	扁平	120							■	■	■	■		
中生	南柑20号	扁平	120								■	■	■	■	■
	久能温州	扁平	120								■	■	■		
	石地	扁球	130								■	■	■	■	
	尾崎温州	扁平	120									■	■	■	■
晩生	大津4号	扁平	120									■	1月下旬まで		
	寿太郎温州	扁平	120										1月下旬まで		
	青島4号	扁平	130									■	■	■	
	古田温州	扁平	120									■	■	■	
	川田温州	扁球	130										1月下旬まで		
	青島温州	扁平	130										1月下旬まで		
	今村温州	扁平	120										1月下旬まで		
	十万温州	扁平	120										■	■	■

中晩柑

	品種名	果形	果重(g)	2月 上	2月 中	2月 下	3月 上	3月 中	3月 下	4月 上	4月 中	4月 下	5月 上	5月 中	5月 下
その他	寧波金柑	短卵円	10	12月より		■	■	■	■						
	福寿金柑	倒卵	35	12月より		■	■	■	■						
	ブラッドオレンジ	扁球	200	■	■	■									
	あすき	扁平	180			■	■	■	■						
	瑞季	短卵	450				■	■	■	■	■	■			
	せとか	扁平	250	■	■	■									
	はるひ	扁球	150	■	■	■									
	あすみ	扁球	150	■	■	■									
	清見	扁球	230			■	■	■	■						
	河内晩柑	短卵	350							■	■	■	■	■	■
	日向夏	倒卵	220										■	■	■
	西内小夏	扁平	130										■	■	■

雑柑、香酸系

	品種名	果形	果重(g)	11月 上	11月 中	11月 下	12月 上	12月 中	12月 下	1月 上	1月 中	1月 下	2月 上	2月 中	2月 下
ネーブル	大三島	扁球	250		■	■									
	山見坂	扁球	250		■	■	■								
	白柳	扁球	250									■	■	■	■
	森田	扁球	250				■	■							
八朔	紅八朔	扁球	280				■	■	■						
	八朔55号	扁球	250				■	■	■						
ポンカン	太田	扁円	150				■	■							
	吉田	扁球	180					■	■	■					
	今津	扁球	180					■	■						
甘夏	甘夏	扁球	400						■	■	■	■	■	■	■
	新甘夏	扁球	400						■	■	■	■	■	■	■
	紅甘夏	扁球	400						■	■	■	■	■	■	■
文旦	晩白柚	球	2000					■	■	■					
	紅まどか	扁平	800					■	■	■	■				
	土佐文旦	扁球	500					■	■	■					
その他	早香	扁平	150				■	■	■						
	宮内伊予柑	扁平	250					■	■	■	■	■			
	不知火	倒卵	250					■	■	■	■				
	天草	扁球	200						■	■	■	■	■		
	スイートスプリング	扁球	250					■	■	■	■	■	■		
	西南のひかり	扁平	180				■	■	■	■					
	みはや	扁球	190			■	■	■	■						
	はれひめ	扁球	250					■	■	■	■	■			
	津之望	扁球	190					■	■						
	あまか	扁球	230					■	■	■	■				
	かんきつ中間母本農6号	扁球	120									■	■		
	はるみ	扁球	190							■	■	■	■	■	■
	たまみ	扁球	150							■	■	■	■		
	津之輝	扁球	200								■	■	■		
	麗紅	扁平	220								■	■	■		
	はるか	扁球	200										■	■	
	ぷちまる	長球	10							■	■	■	■	■	■
	べにばえ	扁球	190						■	■	■				
香酸系	柚子	扁球	120	8月より											
	花柚子	扁球	60	9月より		■									
	カボス	扁球	130	9月より											
	スダチ	扁球	30	10月より											
	ライム	短楕円	100	10月より		■	■								
	レモン	卵	150	10月より		■	■	■	■	■					
	璃の香	紡錘	200		■	■	■	■	■						

赤文字は種苗法の登録品種です。 PVP

※一覧表の収穫期は地方により差がありますので、参考までにご覧ください。

※果重はおおよその重さになります。

柿苗・甘柿



太秋

甘柿人気No.1

農研機構にて「富有」×「IIiG-16(「次郎」×「カキ興津15号」)」より選抜育成され、樹勢は「松本早生富有」並みで中位、雌花、雄花、完全花の3種を着生する。果実は、「松本」よりかなり大きく約400g程度と成り扁円形の完全甘柿である。糖度は16～18%位で「松本」より1～2%高く果実の日持ちも良好で成熟期は11月上旬で「松本」と同時期だが大果型の完全甘柿として期待される。

果重:400g | 果形:扁円 | 収穫期:10月下旬～11月下旬



早秋

PVP

早生の完全甘柿

農研機構にて「伊豆」×「109－27(「カキ興津2号」×「カキ興津17号」)」より選抜育成された早生の完全甘柿である。果重は、250g位で肉質は緻密。扁平で糖度は14～15%、へたすきが少なく日持ちも良い。収穫期は9月下旬～10月上旬で「西村早生」に代わる有望品種として期待出来る。

果重:250g | 果形:扁円 | 収穫期:9月下旬



太雅

PVP

「甘秋」×「カキ安芸津19号」(「大御所」×「太秋」)

良食感で、種なし果の生産が可能な早生の完全甘ガキです。完全甘ガキに特異的に生じやすいへたすき果がほとんど発生せず、中生の代表的な完全甘ガキ品種である「松本早生富有」より10日程度早い10月中下旬頃に収穫できる。果汁が多く、果肉が軟らかいため食味が良好である。受粉樹を周囲に混植しなくても早期落果が少ないため、種なし果の安定生産が可能です。夏秋期の気温が高い地域に適応し、「松本早生富有」または「富有」の栽培地域で栽培が可能。

果重:320g | 果形:扁円 | 収穫期:10月中旬～10月下旬



麗玉

PVP

「甘秋」×「カキ安芸津19号」(「大御所」×「太秋」)

農研機構において育成された完全甘柿。成熟期は早生で、10月中下旬であり、「松本早生富有」より2週間程度、「富有」より1ヶ月程度早い。肉質の粗密は中程度、糖度は18%程度であり、「松本早生富有」及び「富有」より高糖で軟らかく、果汁が多く、食味が優れている。果頂裂果はほとんど発生せず、へたすき果についてもほとんど発生が認められず、外観に優れるカキといえる。日持ちは平均24日で「松本早生富有」並みに長い。「麗玉」は、外観が良く麗しいふくよかなカキのイメージに因んで名付けられた。

果重:280g | 果形:扁円 | 収穫期:10月中旬～10月下旬

柿苗・渋柿



愛宕

渋柿人気No.1

愛媛県原産の渋柿で、最晩生の干し柿用品種である。樹勢は強く、果実の大きさは180～280ｇ位とやや大果で、果形は長形で楔形、溝は全く無い。隔年結果が少なく、豊産性である。

果重:300g｜果形:長円｜収穫期:10月中旬～10月下旬



太天 PVP

晩生の不完全渋柿

農研機構にて「黒熊」×「太秋」の交配した実生から選抜された晩生の不完全渋柿である。果形は扁平で果実重は500g程度と著しく大きい。肉質は軟らかく、多汁で食味が優れる。収穫期は11月上中旬である。栽培に当たっては、安定生産のために開花期の合う「禅寺丸」などの授粉樹を混植するとよい。

果重:500g｜果形:扁平｜収穫期:11月中旬～11月下旬



西条

干し柿の代表品種

広島県の原産で干し柿の代表品種である。樹勢は強く、直立性で、果形は細長く卵形で果皮は黄緑色、横断面は方円形、4条の深い側溝がある。果実は150～200g程度で、熟期は早い系統で9月下旬から、晩い系統で11月上旬にかけてである。

果重:180g｜果形:楕円｜収穫期:10月下旬～11月上旬

八秋 渋 PVP

世界初の「八倍体」のわい性品種で、一般的な「平核無」に比べて樹木や果実が小さく、糖度が高くて脱渋しやすい特徴。

果重:71g｜果形:不正円形｜収穫期:10月下旬

渋葉隠 高瀬 渋

福岡原産の渋柿と言われ、干し柿用の代表的品種。樹勢は強く豊産性で隔年結果が少ない。果実は約250g位で、豊円形で溝はない。熟期は11月中下旬で日持ちが良い上、甘味が強く営利栽培に適する。

果重:250g｜果形:扁円｜収穫期:11月中旬～11月下旬

豊楽台 PVP

わい化効果があり、高生産性で省力栽培が期待できるカキのわい性台木品種です。主要品種である「富有」のわい性台木として活用できます。
受注生産になります。接木苗のみの販売となっております。（台木での販売は禁止されております）

桃 苗



ひめまるこ　PVP

「紅国見」×「ひめこなつ」

桃の極早生には満開後70日頃に収穫できる白肉品種がありますが、桃の生産、消費の拡大のため、より収穫期の早い品種が求められている。「ちよひめ」や「はなよめ」より9日程早く収穫できる品種。果実は170gとやや小ぶり。糖度は15%で酸味は少なく食味良好。桃の収穫期を早める白肉品種として、特に「ちよひめ」や「はなよめ」の栽培の多い地域での普及が期待される。

果重:170g | 花粉:有 | 収穫期:6月上旬～6月下旬



なつおとめ　PVP

「あかつき」×「よしひめ」

農研機構にて育成された品種である。果形は扁円形で果重は250～300g位となり玉揃いも良好である。果皮着色は条状で果肉は白色、肉質は緻密で食味良好。成熟期は7月中下旬で、外観、品質ともに優れている品種である。

果重250～300g | 花粉:有 | 収穫期:7月中旬～7月下旬



つきあかり　PVP

「まさひめ」×「あかつき」

農研機構にて育成された黄肉品種。収穫期は7月下旬～8月上旬。果形は扁円形で果実重量は220g余り。果皮の地色は黄色で着色は少ない。糖度は平均で14%程度、酸味は「黄金桃」に比べて少なく、黄肉モモ特有の香りがあり、食味は良好である。

果重:220g | 花粉:有 | 収穫期8月上旬～8月中旬



つきかがみ　PVP

「モモ筑波115号」×「モモ筑波105号」
大果で食味に優れる生食用黄肉モモ新品種

黄肉の主要品種「黄金桃」より一週間程度遅く8月中下旬に収穫される晩性品種。果実は350ｇと大果で、糖度も高く食味が優れている。裂果や果面の荒れが少なく外観が優れ、無袋栽培が可能。「黄金桃」からリレー出荷できる生食用黄肉品種として今後の普及が期待される。

果重350g | 花粉:有 | 収穫期:8月中旬

桃 苗



ひめこなつ PVP

「182-3{「岡山446」×
「れ-40(「白桃」×「白鳳」)」}」
×「65-20(「高陽白桃」×「さおとめ」)」

農研機構で育成された極早生品種である。果形は扁円形で果実重は平均120g前後と小さい。果肉は黄色で溶質、果汁は多く、糖度12%を超え食味は良好である。花粉を有し、自家結実性で果実の着生は良い。熟期は6月上中旬で「ちよひめ」より10日程早い。

果重:110～130g | 果形:扁円 | 収穫期:6月上旬～6月中旬



はなよめ

「日川白鳳」の枝変わりの極早生品種。果重170～250ｇ位で極早生種としては大きい。果形は短楕円形、果皮の地色は乳白色で着色は良い。果肉質は溶質で、果汁多く、甘味は中、酸味は少ない。6月下旬成熟の極早生種としては果実肥大、着色共に優れている。

果重200～250g | 果形:短楕円 | 収穫期:6月上旬～6月下旬



あかつき

桃の代表品種!

「白桃」×「白鳳」を交雑育成した中生品種。果重200～250g位、果形は円～やや扁円形で玉揃い良い。果皮の地色は白で、着色は鮮紅色。果肉はち密で多汁、甘味多く、「白鳳」より高糖度で濃厚な、食味良好な品種である。

果重:220g | 果形:扁円 | 収穫期7月中旬～7月下旬



日川白鳳

「白桃」の子と考えられる早生種。果重200～250ｇ位、果形は楕円形で玉揃いも良い。
果皮色は全面濃紅色となり、着色は良好である。果肉は白色、肉質はち密で果汁多く、甘みも強く食味良好である。早生種として品質優良なお勧め品種である。

果重:200～250g | 果形:楕円 | 収穫期:6月下旬～7月上旬

スモモ苗



ハニービート

PVP

「PP-26-6」(「ソルダム」×「オザークプレミアム」)×「太陽」

農研機構において、「ソルダム」より早く収穫できる酸味少なく甘味が多いスモモとして育成された品種である。果形は円形で、果重は124g程度と「ソルダム」と同程度である。果皮の着色は赤紫色で果肉は黄色である。果梗部を中心に輪紋が発生しやすい。収穫盛期は育成地(茨城県つくば市)で7月12日頃であり「ソルダム」より11日程度早い食味良好な品種である。

果重:125g | 果肉色:黄 | 収穫期:7月上旬～7月中旬



大石早生

スモモ人気No.1

「フォーモサ」の自然交雑実生から育成された早生の代表品種。果重は70～100ｇ位で、果形は円形、果皮は完熟すると濃紅色になる。果肉は淡黄色で軟らかく、果汁多く食味が良い。

果重75～90g | 果肉色:淡黄 | 収穫期:6月中旬～6月下旬



貴陽

「太陽」の交雑実生。果実の大きさは200gと大きく、果形は円形で果皮の色は紅く、果肉は淡黄色。果汁、甘味は多く、酸味は少ない。熟期は7月上中旬で、授粉樹には「ハリウッド」が適している。

果重:200g | 果肉色:淡黄 | 収穫期:7月上旬～中旬



ソルダム

果重は100～130ｇ位で、果形は円形。果皮は緑黄色で白い果粉に被われる。果肉は濃紅色で緻密、果汁多く、完熟果の糖度は高く食味良好なスモモの代表品種。

果重100～150g | 果肉色:濃紅 | 収穫期:7月中旬～7月下旬

梅 苗



南高

人気No.1

和歌山県中心に全国で栽培されている梅の主要品種である。果重は20～30ｇ位で果形は楕円形。果皮は緑黄色で陽光面が紅色に着色する。豊産性で肉質が良く漬け梅（梅干し）には最適な品種である。自家結実性が無いので「小粒南高」等を授粉樹に混植する。

果重:26g | 果形:楕円 | 収穫期:6月中旬～6月下旬



露茜

PVP

「笠原巴旦杏」×「養青梅」

農研機構で育成された品種である。果形は円形で果実重は68g前後と大きく、果皮全面に鮮紅色に着色し、果肉も成熟に伴い鮮紅色となる、梅酒やジュースにした場合きれいな紅色となる。
収穫期は7月上中旬である。
授粉樹として「豊後」、アンズを用いる。



果重:68g | 果形:円形 | 収穫期:7月上旬～7月中旬



竜峡小梅

長野県の奨励品種であって、果実は甲州最小より大きく、豊満な円形で、粒が極めて良く揃い、果肉が厚く核が小さい。樹勢旺盛にして病虫害にも強い。結果率が高く頗る豊産で隔年結果がない。

果重:4g | 果形:小円 | 収穫期:5月下旬～6月上旬

和郷

PVP

「剣先」×「MM-43-22（梅郷×MM-20-2）」

自家和合性なので受粉樹が不要で安定した梅新品種。果実が大きく、ヤニ果の発生が少ないため、梅干しや梅酒などの用途に優れた特性とともに、開花期がやや遅いため、「白加賀」など開花期が遅い自家不和合性品種の受粉樹としても期待される。
果形は短楕円形で果実は30g以上の大果になる。

果重:30g | 果形:短楕円 | 収穫期:6月中旬

麗和

PVP

「加賀地蔵」×「月知梅」

自家和合性なので受粉樹が不要で結実が安定した梅新品種。実が大きく、ヤニ果の発生が少ないため、梅干しや梅酒などの用途に優れた特性とともに、開花期がやや遅いため、「白加賀」など開花期が遅い自家不和合性品種の受粉樹としても期待される。果形は円形で果実は30g以上の大果となる。
花弁は白色で八重咲きなので、花も実も楽しめる。

果重:30g | 果形:円形 | 収穫期:6月中旬～6月下旬

梨苗



凛夏 PVP

(「豊水」×「おさ二十世紀」)×「あきあかり」

樹勢は「幸水」と同程度、短果枝の着生は「幸水」より多く、えき花芽の着生は同程度で、安定して花芽が着生する。収穫期は「幸水」に近い時期で、8月下旬である。果実の重さが500g程度で「幸水」よりも大果。果肉硬度は「幸水」より柔らかく、肉質良好。糖度は「幸水」と同程度である。日持ち性は「幸水」以上。暖地でも花芽が安定的に着生することで安定生産を可能とするニホンナシ新品種。

果重:500g | 収穫期:8月下旬～9月上旬



あきづき PVP

「162-29(「新高」×「豊水」)」×「幸水」

本種は農研機構において「162-29(「新高」×「豊水」)」に「幸水」を交雑育成した品種である。糖度12～13%位。結実性良く、豊産性である。熟期は9月中下旬の晩生である。

果重:500g | 収穫期:9月上旬～9月下旬



豊水 果重:350～400g | 収穫期:8月中旬～8月下旬



幸水 果重300g | 収穫期:8月中旬～8月下旬

主な梨花粉用品種

- 新興
- ネパール梨
- 横山

現在多くの梨農家が中国産花粉を使っていますが、現地で「火傷病」という病気が広がり、2023年8月から輸入停止になりました。
このため、人工授粉のための花粉が足りなくなるおそれがあるといいます。



栗苗



筑波

人気No.1　岸根×芳養玉

中生の多収性品種で我が国では最も広く栽培されている。成熟期は9月下旬で、果実は28g程度。果肉は淡黄色を呈し、粉質で甘味が多く、香気もある。裂果、双子果はほとんど認められず、品質は極めて優良。

果重:20g | 果形:三角 | 収穫期:9月下旬～10月上旬



丹沢

早生種の代表品種

早生種の代表品種で、果重は23g位。果肉は黄色、肉質は粉質で品質は良い。樹勢は強く、早期結実性で豊産性である。

果重:20g | 果形:帯円三角 | 収穫期:8月下旬～9月上旬



ぽろたん

PVP

550-40{290-5(「森早生」×「改良豊多摩」)×「国見」}×「丹沢」

農研機構にて育成された品種。樹姿はやや直立で樹勢はやや強、果実は扁球で大きさは27g位の大栗である。果肉の色は黄色、肉質は粉質、甘味、香気はともに多い。成熟期は9月上中旬と「国見」と同時期である。渋皮剥皮性が良好で、加工用途や家庭消費の拡大等が期待できる品種である。

果重:27g | 果形:扁球 | 収穫期:9月上旬～9月中旬

利平

甘みが強く、肉質も良好、ゆで栗の食味は最高。樹勢は強く、豊産性で、耐暑性、耐病性共に強い、作りやすい。樹齢が進むにつれ、素晴らしい果実が収穫できる、人気のある品種。渋皮の剥皮が難点。果実は23～25g。収穫期は10月上中旬頃。

果重:23g | 果形:扁円 | 収穫期:10月上旬～中旬

銀寄

晩生種の代表品種で果実の大きさは20~25g位で、果肉は淡黄色で粉質、甘味も多い。果実の粒揃いも良く、樹勢も強く、開帳性。

果重:25g | 果形:扁円 | 収穫期:9月下旬～10月上旬

アンズ苗　イチジク苗



おひさまコット　PVP

「アンズ筑波5号」×「ハーコット」

収穫期は6月下旬で、豊産性。果実重は110～120gと非常に大果。果皮は橙色で外観が良く、裂果の発生は極めて少なく、栽培性に優れている。果肉は緻密で果汁が多い。糖度も高く、生食用としての食味に優れている。自家和合性で結実性が良いため、摘果を適正に行う必要がある。

果重:110～120g | 収穫期:6月下旬



ドーフィン

イチジクの定番品種!

皮は薄くて柔らかく、剥かなくてもそのまま食べられる。生食のほか、ジャムにもおすすめ。



ニコニコット　PVP

「ライバル」×「アンズ筑波5号」

収穫期は6月下旬。果実重は90g前後。果皮は橙色で外観に優れ、裂果の発生は少ない。在来の日本のあんず品種に比べて糖度が高く酸味が少ないため、生食用としての食味に優れている。

果重90g | 収穫期:6月下旬

励広台1号　PVP

励広台1号は、株枯病に極めて強いイチジク属野生種。イヌビワとイチジクとの種間雑種から選抜され、株枯病菌の有傷接種試験に対して病斑の拡大がほとんど無く、イヌビワと同程度の極めて強い抵抗性を示す。
受注生産になります。接木苗のみの販売となっております。(台木での販売は禁止されております)

キバル台木使用いちじく苗

株枯病に対してほ場抵抗性を示すとともに、連作ほ場においても樹勢低下がなく安定生産が得られるいちじくの台木。樹勢や収穫性が優れ、果実品質も自根樹と同等である。改植更新の際に台木として活用が期待され、連作障害や株枯病を回避するための有効な手段として期待される。
受注生産になります。接木苗のみの販売となっております。(台木での販売は禁止されております)

ぶどう苗



グロースクローネ PVP

「藤稔」×「安芸クイーン」

農研機構において、「巨峰」や「ピオーネ」より着色が優れ、種なし栽培できる大粒品種として育成されたブドウである。樹勢は強く、収穫期は「巨峰」、「ピオーネ」と同時期である。果皮色は紫黒色で、満開時と満開10～15日後のジベレリン処理により育成地（広島県東広島市）においては20g程度の果粒が得られている。「巨峰」、「ピオーネ」よりも安定した良着色果となるため、着色不良が起こりやすい西南暖地での普及が見込まれる。

果重:20g | 収穫期:8月中旬～8月下旬



シャインマスカット PVP

人気No.1

「ブドウ安芸津21号」×「白南」

農研機構において育成された大粒で肉質の優れた黄緑色品種。成熟期は8月下旬～9月上旬で「巨峰」とほぼ同時期である。果粒重13ｇ。糖度20%程度と高く、果肉は良く締まり歯応えが良く食味良好である。ジベレリン処理による種無し栽培が可能なうえ、皮ごと食べられる画期的品種である。

果重:13ｇ | 収穫期:8月中旬～9月上旬



クイーンニーナ PVP

「安芸津20号」×「安芸クイーン」

農研機構果樹研究所において育成された大粒で食味の良い赤色品種。成熟期は8月下旬~9月下旬で「巨峰」よりやや遅い。果粒重16g。糖度は21%程度で「巨峰」「ピオーネ」より高く、果肉は硬く崩壊性で歯応えがよく食味に優れている。ジベレリン処理による種無し栽培も可能で今後の普及が期待される。

果重:16g | 収穫期8月下旬～9月上旬



巨峰

定番品種!

熟期は、8月中旬頃で、果房大きく1kgに達する。粒も最大で15~20g位で熟すると紫黒色となり、甘味強く、食味良く、品質最も良く、露地ブドウの最高峰である。樹勢極めて旺盛、病害にも強く栽培容易であるが、花振性があるので、栽培管理上注意を要する。

果重:15～20g | 収穫期:8月上旬～8月下旬

枇杷苗



はるたより PVP

「長崎早生」×「77-856」
（「津雲」×「シャンパン」）

長崎県農林技術開発センターにおいて育成された品種。樹勢は強く、やや開張性である。最重要病害であるビワがんしゅ病に対して抵抗性である。成熟期はハウス栽培で4月中旬頃で「長崎早生」よりやや遅い。果実重は60g前後と大果である。果皮は橙黄色、果肉は厚く柔らかで果汁も多い。日持ちが良く、食味良好な優良品種である。

果重:60g | 収穫期4月中旬～4月下旬



なつたより PVP

「長崎早生」×「福原早生」

長崎県果樹試験場（現長崎県農林技術開発センター）にて育成された品種。成熟期は5月下旬で「茂木」より少し早い。果実重は60ｇ以上と非常に大果なうえ、豊産性である。果皮、果肉ともに橙黄色。糖度が高く、果肉が厚く、柔らかい。樹勢も強く、比較的病気にも強い。大果で、外観、食味ともに市場価値の高い品種で期待されている。

果重:60ｇ | 収穫期5月下旬～6月上旬



茂木

定番品種!

江戸時代に中国から持ち込まれた唐ビワの実生と言われている西日本を代表する品種。成熟期は6月上旬。果実重は40ｇ程度。甘味が強く、酸味は控えめで食味が良い。果皮は薄く、剥皮が容易な経済的品種。

果重:40g | 収穫期6月中旬～6月下旬



涼風（すずかぜ）

「楠」×「茂木」

長崎県果樹試験場（現長崎県農林技術開発センター）において育成された品種。成熟期は6月上旬。果実重は55ｇ程度。糖度高く、果汁が多い。酸味の少なさが特徴で食味良好である。

果重:55ｇ | 収穫期6月上旬～6月中旬

リンゴ苗　キウイ苗



ローズパール　PVP

「ふじ」×「ピンクパール」

樹勢は中位で、花芽の着生程度は中程度。収穫盛期は10月中下旬で、中生品種の「紅玉」とほぼ同時期に収穫できる。果皮は黄色で陽光面がわずかに淡赤色に着色し、果面にさびはほとんど発生しない。果実は390g程度と大果。果肉が桃色に着色し、果汁の糖度は14～15%、酸度は0.6%程度。すっきりとした程よい酸味と食感の良さが特徴である。
果肉色、果汁の色が桃～淡赤色で、その色調を生かして特徴あるジュースやジャムなどの加工品製造やサラダなど調理用や生食用にも適している。

果重:390g｜果形:円形｜収穫期:10月中旬～10月下旬



ルビースイート　PVP

「JP114069」×「ふじ」

樹勢は中位で、花芽の着生程度は中程度である。収穫盛期は10月中下旬で、中生品種の「紅玉」とほぼ同時期に収穫できる。果皮は赤色で着色が多く、果面にさびはほとんど発生しない。果実は450g程度と大果。果肉が赤く着色し、果汁の糖度は14～15%、酸度は0.3～0.4%で、甘味が多く食味良好である。果肉色、果汁の色が桃～淡赤色で、その色調を生かして特徴あるジュースやジャムなどの加工品製造やサラダなど調理用や生食用にも適している。

果重:450g｜果形:円形｜収穫期:10月中旬～10月下旬



ヘイワード

キウイフルーツの代表品種。果肉が緑色。

果重:100g｜収穫期11月上旬～11月下旬

ゴールデンキング

キウイフルーツの果肉が黄色の代表品種。

果重:100～130g｜収穫期11月上旬～11月下旬

近年、かいよう病の問題や輸入花粉の高騰により、人工授粉用の花粉を自家採取に取り込む生産者が多くなってきている。
キウイフルーツかいよう病（Psa3系統）の世界的な流行は花粉生産にも大きな影響を与えており、かいよう病発生地域で採種した花粉には、かいよう病菌の混入リスクがあることや花粉生産国での感染拡大により花粉の輸入がストップする可能性も指摘されている。

主な授粉樹

- トムリ
- 早雄
- ロッキー
- 孫悟空
- チーフタン



ネクタリン・サクランボ・ぎんなん・プルーン苗



ネクタリン収穫期一覧表

品種名	果形	果重(g)	7月			8月			9月		
			上	中	下	上	中	下	上	中	下
ヒラツカレッド	短楕円	200									
秀峰	円	220~250									

※果重はおおよその重さになります。

桜桃収穫期一覧表

品種名	果皮色	果重(g)	5月		6月			7月		
			中	下	上	中	下	上	中	下
暖地桜桃	帯赤黄	4~5								
高砂	帯赤黄	4~6								
佐藤錦	黄に帯鮮紅	4~6								
ナポレオン	赤斑黄	6~8								

※果重はおおよその重さになります。





銀杏収穫期一覧表

品種名	果形	果重(g)	7月			8月			9月		
			上	中	下	上	中	下	上	中	下
金兵衛	長円形	4									
久寿	長円形	4~5									
嶺南	豊円	4~5									
藤九郎	豊円	4~4.5									

※果重はおおよその重さになります。

プルーン収穫期一覧表

品種名	果形	果重(g)	果皮	自家結実	8月			9月		
					上	中	下	上	中	下
シュガープルーン	卵	30~45	紫黒	○						
サンプルーン	卵円	45	紫黒	○						

※果重はおおよその重さになります。



ブルーベリー苗



■ラビットアイ系　■ノーザンブッシュ系　■サザンハイブッシュ系

その他

雑果苗

品種名	収穫時期
朝倉サンショ(青芽)	5月中下旬より
びっくりグミ	6月上旬より
ゆすらうめ	6月上旬より
山桃(接木)	6月下旬より
ラズベリー	5月中旬より
クルミ	9月上旬より
カリン	10月上旬より
大実ザクロ	10月中旬より
オリーブ	9月下旬より

観賞用花桃・花梅苗の部

品名	品名
寒咲赤花桃	シダレ梅(赤)
寒咲白花桃	シダレ梅(ピンク)
矢口花桃	シダレ梅(白)
源平花桃	鹿児島紅梅
いかり桃	筑紫紅梅
菊桃	
京舞妓	
シダレ花桃(各種)	

各種台木

品種名	
カラタチ台木	2年生
カラタチ台木	1年生
ヒリュウ台木	2年生
ヒリュウ台木	1年生
梨台木	1年生
豆梨台木	1年生
桃台木	1年生
梅台木	1年生
桜台木	1年生
洋李台木	1年生
栗台木	1年生

果樹園用防風樹

品種名	
マキ苗	2年生
ヒノキ苗	2年生
スギ苗	2年生
クヌギ苗	1年生
ラカンマキ苗	30cm

赤文字は種苗法の登録品種です。PVP
※果重はおおよその重さになります。

収穫期一覧表

梨収穫期一覧

品種名	果重(g)	7月下	8月上	8月中	8月下	9月上	9月中	9月下	10月上	10月中	10月下	11月上	11月中	11月下	12月上	12月中	12月下
はつまる	330																
なつしずく	300~350																
幸水	300																
ほしあかり	400																
なるみ	600																
豊水	350~400																
あきあかり	350~400																
ゴールド二十世紀	300~350																
凛夏	500																
あきづき	500																
甘太	550																
新興	400																
新高	450~500																
王秋	500~600																
愛宕	1000~2000																
ラ・フランス	150~200																

梅収穫期一覧

品種名	果形	果重(g)	5月上	5月中	5月下	6月上	6月中	6月下	7月上	7月中	7月下
甲州最小	短楕円	5									
竜峡小梅	小円	4									
信濃小梅	小円	4.5									
光陽小梅	小円	4.5									
鴬宿	豊円	26									
玉英	短楕円	28									
白加賀	短楕円	28									
青軸	短楕円	30									
南高	楕円	26									
豊後	大円	45									
翠香	円形	35									
小粒南高	楕円	21									
露茜	円形	68									
和郷	短楕円	30									
麗和	円形	30									

栗収穫期一覧

品種名	果形	果重(g)	8月上	8月中	8月下	9月上	9月中	9月下	10月上	10月中	10月下
森早生	三角	18									
丹沢	帯円三角	20									
ぽろすけ	広卵形	22									
出雲	三角円	25									
国見	扁円	23									
ぽろたん	扁球	27									
紫峰	三角	25									
筑波	三角	20									
美玖里	帯円三角	28									
秋峰	帯円三角	23									
銀寄	扁円	25									
岸根	扁円	30									
利平	扁円	23									
石鎚	扁円	22									

甘柿収穫期一覧

品種名	果形	果重(g)	9月上	9月中	9月下	10月上	10月中	10月下	11月上	11月中	11月下
早秋	扁円	250									
西村早生	扁円	200									
貴秋	扁平	350									
禅寺丸	扁円	250									
輝太郎	扁円	300									
太雅	扁円	320									
麗玉	扁円	280									
松本早生富有	扁円	300									
次郎	扁平	220									
新秋	扁円	250									
甘秋	扁平	250									
太秋	扁円	400									
太豊	扁円	330									
富有	扁円	300									
小春	正円	120									
つきまる	扁平	414									

枇杷収穫期一覧

品種名	果重(g)	糖度(%)	4月上	4月中	4月下	5月上	5月中	5月下	6月上	6月中	6月下
はるたより	60	13									
長崎早生	40~50	13									
なつたより	60	13									
陽玉	60	13									
涼風	55	13									
茂木	40	12									
田中	60	11									

渋柿収穫期一覧

品種名	果形	果重(g)	9月上	9月中	9月下	10月上	10月中	10月下	11月上	11月中	11月下
刀根早生	扁円	180									
平無核	扁平	200									
愛宕	長円	300									
西条	楕円	180									
蜂屋	長円	300									
太月	扁平	450									
太天	扁平	500									
渋葉隠(高瀬)	扁円	250									
八秋	不正形	71									

あんず収穫期一覧

品種名	果重(g)	6月上	6月中	6月下	7月上	7月中	7月下
山形3号	45						
平和	35~40						
新潟大実	50						
おひさまコット	110~120						
ニコニコット	90						

赤文字は種苗法の登録品種です。PVP
※果重はおおよその重さになります。

収穫期一覧表

りんご収穫期一覧

品種名	果形	果重(g)	果皮色	8月			9月			10月		
				上	中	下	上	中	下	上	中	下
つがる	円	320	紅縞			■	■					
紅みのり	円	300	赤			■	■					
アルプス乙女	長円	27	濃紅					■	■			
ジョナゴールド	長円	330	黄緑地に紅						■	■		
もりのかがやき	長円	370	黄						■	■		
錦秋	円	300	濃赤色							■		
王林	長円	270	黄								■	■
ふじ	長円	330	濃紅								■	■
紅玉	長円	330	鮮紅								■	■
ローズパール	円	390	黄								■	■
ルビースイート	円	450	濃紅								■	■

桃収穫期一覧

品種名	花粉	果重(g)	6月			7月			8月		
			上	中	下	上	中	下	上	中	下
ひめこなつ	有	110~130	■	■							
はなよめ	有	200~250	■	■	■						
ひめまるこ	有	170	■	■	■						
ちよひめ	有	200~220		■	■						
さくひめ	有	230~250			■	■					
日川白鳳	有	200~250			■	■					
ひなのたき	有	150					■				
あかつき	有	220					■	■			
白鳳	有	180~220					■	■			
なつおとめ	有	250~300					■	■			
大久保	有	250~280						■	■		
つきあかり	有	220							■	■	
川中島白桃	無	300~350							■	■	
清水白桃	有	250~300						■	■	■	
つきかがみ	有	350								■	

イチジク収穫期一覧

品種名	果肉色	果重(g)	8月			9月			10月			11月		
			上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
ドーフィン	鮮紅色	50~114		■	■	■	■	■	■	■	■			
蓬莱柿	鮮紅色	52~92				■	■	■	■	■	■	■		
ホワイトゼノア	淡赤色	60		■	■	■	■	■	■	■				
ビオレソリエス	濃紫色	50~110			■	■	■	■	■	■	■	■	■	

スモモ収穫期一覧

品種名	花粉	果重(g)	果肉色	6月			7月			8月			授粉樹
				上	中	下	上	中	下	上	中	下	
大石早生	少	75~90	淡黄		■	■							サンタローザ、ソルダムなど
ハニーローザ	有	50	淡黄			■	■						大石早生、メスレーなど
メスレー	多	40~60	紅			■	■						サンタローザなど
貴陽	中	200	淡黄				■	■					ハリウッドなど
ハニービート	有	125	黄				■	■					サンタローザ、ソルダムなど
サンタローザ	有	90~110	黄					■	■				ソルダムなど
ハニーハート	有	100	濃紅					■	■				ハニーローザなど
大石中生	少	150	クリーム					■	■				ハリウッドなど
ソルダム	少	100~150	濃紅					■	■				サンタローザ、大石早生など
太陽	少	100~150	紅紫							■			ハリウッドなど

キウイ収穫期一覧

品種名	果重(g)	10月			11月		
		上	中	下	上	中	下
紅妃	80~100		■	■			
東京ゴールド	100			■	■	■	■
ゴールデンキング	100~130				■	■	■
ヘイワード	100				■	■	■
香緑	100			■	■	■	

ぶどう収穫期一覧

品種名	7月			8月			9月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下
デラウェア				■	■				
サニールージュ					■	■			
シャインマスカット					■	■	■		
藤稔					■				
高墨						■			
キャンベルスアーリー						■			
涼香					■	■			
グロースクローネ					■	■			
巨峰				■	■	■			
ピオーネ					■	■			
クイーンニーナ						■	■		
ネオマスカット							■	■	
マスカットベリーA							■	■	■
翠峰						■	■		
安芸クイーン						■	■		
BKシードレス							11月中旬まで		